

Quels sont les symptômes d'une infection ?

- un cordon qui ne sèche pas, un veau toujours mouillé sous le ventre,
- un nombril rouge, douloureux, voire enflammé, et « gros »

Çà c'est pour les « gros nombrils visibles », mais d'autres sont plus insidieux et ne sont pas visibles. Il faut palper et ils sont associés à d'autres symptômes souvent plus graves :


- retard de croissance.
- lorsqu'un abcès monte au foie, les germes de l'abcès passent directement du foie au coeur et de là disséminent partout dans l'organisme : apparition d'une arthrite (veau encore traitable), ou plusieurs arthrites (pronostic sombre), voire de la diarrhée
- mort brutale suite à une rupture d'abcès jusqu'au 1er vêlage.

Prévention :

- Box de vêlage propre fraîchement paillé avec une litière sèche et abondante
- A la naissance, nettoyer et désinfecter le cordon en le trempant dans un gobelet propre, le produit ne servant que pour un veau ou avec un spray de produit desséchant (teinture d'iode, ombridry®, cleanombyl®) pour accélérer l'obturation
- Rompre le cordon si possible à la taille d'un travers de main
- Avoir les mains propres lors de la manipulation du cordon

Quel est le traitement ?

- **Médical** : antibiotique 7 j et anti-inflammatoire 2-3 jours (50% d'efficacité)
Si pas d'amélioration au bout de 3 à 4 jours il faut partir en chirurgie AVANT qu'il ne soit trop tard.
- **Chirurgical** : on retire l'abcès, la thrombose, ou on ferme l'ouraque, en fonction de ce que l'on trouve
- Pour les hernies, il y a un risque d'occlusion intestinale si l'on peut passer 2 doigts dans le trou. Dans ce cas le seul traitement est chirurgical (prédisposition femelle laitière, antécédent de gros nombril).



GROS NOMBRIL

Le cordon ombilical est constitué de la veine des artères ombilicales et du canal de l'ouraque. La veine ombilicale rejoint le foie (elle véhicule le sang oxygéné vers le fœtus). Le canal de l'ouraque se situe entre les deux artères ombilicales et rejoint la vésicule biliaire par l'ouraque. Après la naissance le foie dans l'utérus. Après la naissance ces structures réduisent et disparaissent rapidement.